

Importante seguir medidas para la prevención de la Viruela Símica

Posted on 29 de julio de 2022 by Diario Humano



Así lo establece la guía para el manejo médico de la enfermedad emitido por la autoridad federal

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur (BCS).- La aplicación de medidas preventivas como la desinfección frecuente de manos; cubrir nariz y boca al estornudar o toser con etiqueta respiratoria, así como evitar el contacto físico con personas infectadas o con sospecha de viruela símica, son determinantes para reducir riesgos por esta enfermedad viral, estableció la secretaria del ramo, Zazil Flores Aldape.

Al confirmarse el primer caso por este padecimiento en la entidad, la servidora pública recordó que principalmente se transmite por contacto estrecho con personas contagiadas, con sus lesiones, flujos corporales o gotas respiratorias, así como al tocar objetos contaminados (ropa, toallas, sábanas, entre otros) de una persona contagiada.

Flores Aldape recordó que entre los síntomas generados por esta patología destaca el inicio repentino de fiebre, múltiples lesiones en la piel en forma de ampollas, dolor de cabeza y cuerpo e inflamación de ganglios linfáticos, al establecer que en caso de presentar alguna de estas manifestaciones es necesario acudir al médico y evitar el contacto con otras personas.

Comentó que el período de incubación de la viruela símica puede extenderse hasta por 21 días y explicó que las personas infectadas pueden contagiar desde que inician síntomas hasta que todas las lesiones de su piel sean cicatrices, de ahí la importancia en estar atentos a las señales de alerta asociadas a la enfermedad.

Agregó que de acuerdo al seguimiento realizado por autoridades sanitarias internacionales y del país, se considera que la mayoría de casos experimentan cuadros de leves a moderados por ser un padecimiento que se autolimita de dos a cuatro semanas, pero pueden presentarse complicaciones en personas con padecimientos que limitan el sistema inmunitario.

Puntualizó que el sector salud de BCS mantiene acciones de vigilancia epidemiológica con búsqueda activa de casos en unidades médicas, así como la implementación de una red negativa diaria de casos probables de viruela símica en las cuatro jurisdicciones sanitarias de la entidad, esto en apego a las indicaciones de la autoridad sanitaria estatal.