

Alertan por incremento de Covid-19 en Baja California Sur

Posted on 21 de julio de 2024 by Diario Humano



Salud estatal destaca importancia de la higiene básica para prevenir enfermedades respiratorias como el Covid-19

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. -La aplicación puntual de medidas de higiene básica, como es el lavado frecuente de manos y el uso recomendado de cubrebocas cuando se presentan síntomas respiratorios, es fundamental para reforzar la prevención de enfermedades virales respiratorias, como es Covid-19 e Influenza, indicó la secretaria de salud, Zazil Flores Aldape.

Al indicar que la entidad presenta un incremento en la incidencia de coronavirus de acuerdo al modelo de vigilancia epidemiológico centinela que se aplica en todo el país para seguir el comportamiento de la enfermedad, la servidora pública enfatizó la recomendación de cubrir boca y nariz con el antebrazo, o con pañuelo desechable, al momento de toser o estornudar, así como abstenerse de tocarse el rostro con las manos sucias.

Asimismo, es aconsejable acudir a consulta médica ante la presencia de sintomatología asociada a infecciones respiratorias, priorizar el resguardo domiciliario en tanto se tengan estas reacciones o bien colocarse la mascarilla en caso de tener que salir del domicilio, para evitar la diseminación de patógenos. Además de la relevancia de propiciar la ventilación de espacios y la desinfección de superficies y objetos de uso común.

Enfatizó la sugerencia de que las y los adultos mayores, así como personas con comorbilidades (como diabetes, hipertensión, cáncer, insuficiencia renal y otras que debiliten el sistema inmunológico), utilicen correctamente el cubrebocas cuando asistan a sitios altamente concurridos y espacios cerrados, a fin de reducir riesgos por estas patologías.

Flores Aldape, explicó que en la semana epidemiológica 21 se tuvo una positividad de pruebas del 14 por ciento, en la 26 (que correspondió del 24 al 30 de junio) se tuvo un indicador de 26 por ciento.

Por lo que en las últimas cuatro semanas se han registrado entre dos y cinco pacientes hospitalizados por esta causa, así como tres defunciones, las tres en adultos mayores, con comorbilidades y sin antecedentes de vacunación, agregó.