

Varicela en BCS: casos a la baja y sin hospitalizaciones preocupantes

Posted on 25 de junio de 2025 by Diario Humano



El virus de la varicela sigue presente, pero con medidas adecuadas, la población infantil enfrenta cuadros leves y controlados.

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. -La incidencia de varicela en menores se encuentra dentro del margen epidemiológico de seguridad en Baja California Sur durante este 2025, al no presentar, hasta este periodo del año, un incremento de riesgo con respecto de periodos anteriores, ni presentar reportes de hospitalizaciones o decesos que lamentar por esta infección viral.

El promedio anual de casos reportados en la última década ha sido de mil 310 en la entidad. Desde entonces, la morbilidad ha mostrado un descenso progresivo, registrándose un total de 749 casos al cierre de 2024 explicó el subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Alfredo Ojeda Garmendia al comentar que esta enfermedad genera cuadros leves en población infantil, por lo que en adultos puede presentar reacciones de mayor severidad.

El servidor público precisó que, de acuerdo a datos epidemiológicos, la mayoría de las personas contrae varicela solo una vez en la vida; sin embargo, el virus permanece en el organismo tras la infección inicial y puede reactivarse años después como herpes zóster, especialmente cuando el sistema inmunológico se

encuentra debilitado.

Esta patología, que es muy común en la niñez, es causada por el virus varicela-zoster, que provoca fiebre, dolor de cabeza, fatiga y erupciones en forma de ampollas que se secan formando una costra.

Cabe mencionar que no existe tratamiento específico para su curación, aunque se pueden utilizar antivirales para reducir su periodo de infección, comentó Ojeda Garmendia al subrayar que se transmite al tocar el líquido de ampollas de personas enfermas o a través del contacto con su saliva o flujos nasales.

Entre las medidas de prevención se encuentra el aislamiento domiciliario en pacientes confirmados con esta afección, evitar el contacto con personas contagiadas y la aplicación de la vacuna a niñas y niños de uno a cuatro años, aunque no se encuentre contemplada en el esquema universal.