

BCS registró 6 defunciones por COVID-19 en 2025

Posted on 5 de enero de 2026 by Diario Humano



La mayoría de los casos correspondió a personas sin vacunación o con esquemas incompletos, informó Epidemiología estatal.

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.—El COVID-19 ocasionó en Baja California Sur 111 hospitalizaciones de pacientes que desarrollaron cuadros graves de la enfermedad, la mayoría de ellos sin antecedente de vacunación o con esquemas incompletos contra el virus.

Asimismo, esta infección respiratoria aguda derivó en seis defunciones en el año que recién concluyó: tres en pacientes masculinos y tres en femeninos, con una edad promedio de 62 años, quienes no contaban con esquema de vacunación, informó el subdirector de Epidemiología, Alfredo Ojeda Garmendia.

El servidor público subrayó que estos datos reflejan la importancia de que personas adultas mayores y con



comorbilidades acudan a vacunarse, al ser los grupos con mayor riesgo de presentar complicaciones asociadas a esta enfermedad.

En este contexto, señaló que las unidades médicas del sector salud en la entidad disponen de vacunas contra el COVID-19 para la atención de los grupos prioritarios, conforme a los lineamientos federales, al recordar que durante la actual campaña de vacunación invernal se aplican en el país biológicos desarrollados por las farmacéuticas Pfizer y Moderna.

Ojeda Garmendia enfatizó que, ante el descenso de temperaturas y el incremento estacional de infecciones respiratorias agudas, es fundamental utilizar cubrebocas cuando se presenten síntomas respiratorios, evitar la automedicación y acudir de manera oportuna a valoración médica.

De igual forma, recomendó prevenir cambios bruscos de temperatura, mantener el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de gel alcoholizado, así como aplicar la etiqueta respiratoria, cubriendo boca y nariz con el antebrazo al toser o estornudar.

Finalmente, indicó que personas con comorbilidades y adultos mayores deben usar correctamente el cubrebocas en espacios cerrados o con alta concentración de personas, además de favorecer la ventilación de áreas comunes, medidas que contribuyen a reducir riesgos asociados a infecciones respiratorias agudas.